



DOS'OPTREX S lav ocul 15Doses/10ml



Prix au 17/02/2020 à 20:19

3.95 € TTC Disponibilité : En stock

Indications

Solution oculaire à l'HAMAMELIS, pour le soin et l'hygiène des yeux, à action apaisante, décongestionnante et antiseptique, permettant de réaliser un lavage oculaire en douceur pour calmer et décongestionner les yeux fatigués, gonflés, secs ou irrités.

Composition

Chlorobutanol (DCI) hémihydraté 38 mg

Acide salicylique 38 mg

Alcool 5,7 g

Acide borique 3,8 g

Hamamélis, eau distillée concentrée 760 mg

Excipients : borax, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 219), eau purifiée.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Grossesse, Fertilité, Allaitement

convient à l'allaitement

convient à la fertilité

convient à la grossesse

Posologie

Voie locale.

En lavage oculaire.

3 ou 4 lavages oculaires par jour.

Les lavages se font de façon directe par jet en retournant le flacon et en appuyant légèrement sur celui-ci, en prenant garde de ne pas mettre en contact le flacon avec la surface de l'oeil et en essuyant l'excédent avec une compresse ou du coton hydrophile.

En cas de besoin, il est possible de faire jusqu'à 6 lavages oculaires par jour.

En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent, espacer de 15 minutes les instillations.

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation de la solution pour lavage oculaire. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines jusqu'au retour de la vision normale.

Une irritation oculaire peut être due à une infection : en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans prendre un avis médical.

Contre-indications

Ne jamais mettre en contact avec des lentilles cornéennes.

Hypersensibilité à l'acide salicylique, aux substances d'activité proche ou aux autres constituants de la solution.

Effets indésirables

Quelques cas d'irritation oculaire ont été rapportés.

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté ; cependant, une utilisation excessive pourra entraîner une exacerbation des effets indésirables. Dans ce cas, rincer au sérum physiologique stérile et/ou administrer un traitement symptomatique.