

NORMACOL LAVEMENT rectale enfant



Prix au 06/03/2020 à 16:08

2.33 € TTC Disponibilité : Épuisé

Indications

C'est un laxatif administré par voie rectale. Il ramollit les selles et déclenche une contraction du rectum qui permet leur évacuation.

Il est utilisé pour préparer le rectum avant certains examens endoscopiques ou radiologiques.

Il est également utilisé dans le traitement de la constipation, notamment lorsque les selles s'accumulent dans le rectum et que les poussées répétées ne permettent pas de les évacuer.

Le traitement de la constipation chronique repose essentiellement sur des boissons abondantes, une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière.

Attention : Il est nécessaire de boire beaucoup d'eau, particulièrement chez la personne âgée

Ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée ou répétée sans avis médical.

Des précautions sont nécessaires chez la personne fragilisée ou atteinte d'insuffisance cardiaque, d'hémorroïdes, de fissure anale ou de rectocolite hémorragique.

Composition

Par unidose Enf :



Dihydrogénophosphate de sodium	10,92 g
Hydrogénophosphate de sodium	4,8 g
Parahydroxybenzoate de méthyle	+
Acide sorbique	+

Posologie

Introduire la canule dans le rectum et vider doucement le flacon par pression.

Le contenu du flacon ne doit en aucun cas être avalé.

L'effet laxatif se manifeste dans les 5 minutes qui suivent l'administration du lavement.

usuelle:

1 lavement 5 à 20 minutes avant le moment choisi pour la selle en cas de constipation ou 1

lavement la veille au soir et 1 lavement le jour de l'examen en cas de préparation à un examen du rectum.

Contre-indications

Ce traitement ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

maladie responsable d'une obstruction de l'intestin,

mégacôlon,

insuffisance rénale grave,

enfant de moins de 15 ans (solution rectale Adulte),

enfant de moins de 3 ans (solution rectale Enfant).

Effets indésirables

Réaction allergique.

Perte de sels minéraux, en cas de surdosage.

Irritation locale et exceptionnellement des nécroses du rectum.